

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	ALMANACH
Ingrediente activo:	Azoxiestrobina 7.5% + Propiconazol 12.5%
Ingrediente inerte:	Dispersante, solvente, anticongelante, antiespumante, espesante 80%
Presentación:	Suspensión concentrada
Función:	Fungicida
Registro sanitario:	RSCO-FUNG-0333-302-009-023

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ALMANACH es un fungicida recomendado en los siguientes cultivos para el control de enfermedades indicadas a continuación:

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Trigo (30 días)	Roya anaranjada <i>Puccinia recondita</i> Mancha de la hoja <i>Septoria tritici</i>	0.3-0.4 L/ha	Aplicar cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad y/o se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar una aspersión del follaje, de ser necesario realizar una aplicación adicional a intervalo de 14 días
Sorgo, maíz (30 días)	Roya común <i>Puccinia sorghi</i> Tizón foliar <i>Exserohilum turcicum</i>	0.4-0-6 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 500-600 L de agua/ha
Cebolla (14 días)	Moho gris <i>Botrytis squamosa</i>	0.3-0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 479-579 L de agua/ha
Cebolla. Ajo, poro, cebollín (14 días)	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	0.3-0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 479-579 L de agua/ha
Chile, tomate verde, jitomate, pimiento morrón, berenjena, papa (7 días)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0.3-0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 410-510 L de agua/ha

Fríjol , fríjol ejotero, alubia, haba, garbanzo, lenteja, chícharo, soya (30 días)	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemutianum</i> Roya del frijol <i>Uromyces phaseoli</i>	0.4-0.6 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 258-358 L de agua/ha
Fríjol (30 días)	Mancha angular <i>Phaeoisariopsis phaseoli</i>	0.4-0.6 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 258-358 L de agua/ha

() INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

Tiempo de reentrada: No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 12 horas de aplicado el producto

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Siempre lea la etiqueta del producto. Durante su aplicación y manejo use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga, pantalón largo, mandil, guantes de neopreno, lentes de seguridad, gorra mascarilla provista de filtro y botas de neopreno. Constatar el estado del equipo de aplicación al inicio de cada jornada. Por ningún motivo aplique con equipo en malas condiciones. Lavar aparte la ropa y el equipo usado. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado; bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, si la víctima no respira proporcione de inmediato respiración de boca a boca poniendo un trapo limpio de por medio y obtenga atención médica. Si hubo contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón durante 15 minutos. Si ha habido contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si el producto fue ingerido el producto y la persona ésta consciente de a beber agua, no provoque el vómito, consiga atención médica inmediatamente. En caso de inhalación del producto, sacar a la persona del área contaminada y llevar a un lugar ventilado, asegurarse de que respire. Si la persona está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el producto. El envase debe ser abierto embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Girar presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase.

Agregue agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión y vierta lentamente la cantidad recomendada del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione el agua restante para completar la capacidad del tanque. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con 550 a 650 Litros de agua, para obtener una cobertura completa del cultivo.

CONTRAINDICACIONES: Evitar la aplicación con vientos superiores a los 10 km/hora. No aplicar en horas de calor intenso.
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

OTRA INFORMACIÓN: **PETROAGRO, S.A. de C.V.** considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Dirección:

Tel:

E-mail:

Página web:

Petroagro, S.A de C.V.

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

hmreyes@petroagros.com

<http://www.petroagros.com/>

