



FICHA TÉCNICA

DON PETRO 101



DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	DON PETRO 101
Ingrediente activo:	Picloram 10.22% + 2,4-D 31.62%
Ingrediente inerte:	Colorantes, quelante, reactivos, diluyente, impurezas y compuestos relacionados 58.16%
Presentación:	Solución concentrada acuosa
Función:	Herbicida
Registro sanitario:	RSCO-MEZC-HEDE-1219-X0003-014-41.8

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DON PETRO 101 es un herbicida sistémico selectivo (no afecta a los pastos bien establecidos) usado para el control de maleza de hoja ancha herbáceas y leñosas o arbustivas en pastizales o potreros.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizales (14)*	Guinar (<i>Sida acuta</i>) Hierba de la cabra (<i>Croton capitalus</i>) Candelillo (<i>Tecoma stans</i>) Cornezuelo (<i>Acacia cornigera</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Tronadora (<i>Crotalaria sagittalis</i>)	3.0-5.0	Aplicación foliar: En áreas densamente pobladas de maleza, donde sea necesario tratamientos generales, diluir el producto en 200 a 500 L de agua por hectárea. Aplicación al tocón. Para aquellas malezas arbustivas o que tengan las hojas cerosas, recomendadas en esta etiqueta, realice una aplicación a los tocones inmediatamente después de realizar el corte. Se recomienda que los cortes se hagan a una altura no mayor de 20 cm de la superficie del suelo. Mojar perfectamente el corte con una aspersora de mochila estándar y use muy poca presión.
Potreros (14)	Tomatillo (<i>Solanum sp.</i>) Mala mujer (<i>Cnidocolus urens</i>) Mezquite (<i>Prosopis juniflora</i>) Pica pica (<i>Mucuna pruriens</i>) Platanillo (<i>Heliconia bihai</i>) Huizache (<i>Acacia farnesiana</i>) Huizachillo (<i>Acacia tortuosa</i>) YHPata de cabra (<i>Bauhinia divaricata</i>) Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Guamúchil (<i>Phitecelobium dulce</i>) Chicalote (<i>Argemone mexicana</i>) Zarza (<i>Mimosa pigra</i>) Malva (<i>Malva sp.</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>)		
Pastizal establecido en potreros (14)	Mazorquilla (<i>Lupinus campestris</i>) Correhuela (<i>Ipomoea purpurea</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) Cundeamor (<i>Momordica charantia</i>)	4.0 – 5.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza. Volumen de aplicación 300 – 400 L de agua /ha.

(I): Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado para el pastoreo, o la cosecha.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla con respirador, lentes de seguridad o goggles, overol de algodón, guantes y botas de hule. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aplicaciones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las

boquillas con la boca. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. El equipo de protección y el producto deben ser almacenados en el lugar de trabajo. Una vez vacía la botella, no vuelva a utilizarla; destrúyala.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia. Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. En caso de inhalación, retire a la persona del área de exposición llevándola a un lugar bien ventilado; si la persona intoxicada no respira y tiene morados los labios y las uñas, dele respiración asistida boca a boca o

boca-nariz con un trapo delgado de por medio; dele una respiración cada 4 segundos (15 respiraciones por minuto) hasta llegar al hospital. Si el producto ha sido ingerido, NO PROVOQUE EL VÓMITO; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión médica, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad; y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto, llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora. Destape el frasco con cuidado. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua. Agite perfectamente y agregue dicha pre-mezcla al tanque o depósito de la aspersora, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente. La dosis recomendada del producto debe diluirse en 200-500 litros de agua limpia para equipo terrestre; para el caso de Pastizal establecido en potreros, de 300 – 400 L de agua /ha.

CONTRAINDICACIONES: No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr. No permita que la aspersión con este producto entre en contacto con cultivos de hortalizas, flores, vides, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón, oleaginosas, frijol u otras plantas deseables que sean susceptibles a los ingredientes de este producto. No se use en céspedes de gramíneas con estolones como pastos Bent, a menos de que se aplique de manera dirigida a manchones de maleza. Tampoco se use en céspedes o pastizales recién sembrados, sino hasta que las gramíneas se encuentren establecidas (más o menos 45 días después de la siembra).

Pare mejores resultados haga la aplicación cuando la maleza se encuentre en pleno desarrollo y exista humedad en el suelo. Evítese hacer la aplicación cuando las hojas de la maleza hayan perdido su color normal a causa de altas temperaturas y/o sequía, o porque la maleza se encuentre en estado de floración o fructificación, o porque esté en condiciones de inundación.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

FITOTOXICIDAD: Este producto por ser un herbicida que contienen Picloram y 2,4-D, es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha. No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	http://www.petroagros.com/

PETROAGRO