

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	RODEO 50 PH
Ingrediente activo:	Captan 50%
Ingrediente inerte:	Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados 50%
Presentación:	Polvo humectable
Función:	Fungicida
Registro sanitario:	RSCO-FUNG-0306-332-002-050

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RODEO 50 PH es un fungicida agrícola micronizado (polvo humectable) que pertenece al grupo de los carboximidazoles formulados a base de captan en presentación de polvo humectable, utilizado para la prevención y control de enfermedades en los cultivos señalados en el cuadro de recomendaciones.

CULTIVO	ENFERMEDADES Y RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN		DOSIS (kg/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
HORTALIZAS			
AJO, CEBOLLA Y BERENJENA	MANCHA PURPURA	<i>Alternaria porri</i>	1.5 - 2.0
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum spp</i>	2.0 - 3.0
	APLÍQUESE AL PRIMER SÍNTOMA, REPITA CON INTERVALOS DE 5 – 7 DÍAS.		
CUCURBITÁCEAS			
CALABACITA Y MELÓN	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum spp</i>	3.0
	APLÍQUESE CON SUFICIENTE AGUA PARA HACER UN BUEN CUBRIMIENTO Y REPITE CADA 5 – 7 DÍAS SEGÚN SE NECESITE, SE PUEDE APLICAR HASTA LA COSECHA.		
PEPINO Y SANDIA	MANCHA DE LA HOJA	<i>Alternaria cucumerina</i>	1.5 - 2.5
CHILE	CERCOSPORA	<i>Cercospora capsici</i>	2.0 - 3.0
	TIZÓN TEMPRANO	<i>Alternaria solani</i>	
APLIQUE CON INTERVALOS DE 3 – 7 DÍAS.			
FRESA	MANCHA O PECA DE LA HOJA	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	1.0-1.5
	APLIQUE CUANDO SE INICIEN LOS BROTES Y ANTES DE LA FORMACIÓN DE FRUTOS, REPITA SEMANALMENTE.		
JITOMATE	TIZÓN TEMPRANO	<i>Alternaria solani</i>	1.5 - 2.5
	TIZÓN TARDÍO	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0
	MANCHA DE LA HOJA	<i>Stemphylium solani</i>	2.0 - 3.0
	PUDRICIÓN DE LA SEMILLA	<i>Fusarium sp</i>	2.0 - 3.0
	PUDRICIÓN DE LA RAÍZ	<i>Rhizoctonia sp</i>	2.0 - 3.0
APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA DE 5 – 7 DÍAS.			
FRUTALES			
AGUACATERO	ROÑA O SARNA DEL FRUTO	<i>Sphaceloma perseae</i>	3.0
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1.5 - 2.0
	MANCHA DE LA HOJA	<i>Cercospora purpurea</i>	1.0 - 1.5
APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA SEMANALMENTE.			

MANZANO Y PERAL	CENICILLA POLVORIENTA	<i>Podosphaera leucotricha</i>	2.0
	TIRO DE MUNICIÓN	<i>Clasterosporium carpophilum</i>	2.0 - 3.0
	ROÑA O SARNA	<i>Venturia inaequalis</i>	3.0
	HAGA UNA O DOS APLICACIONES CON FUMIGACIONES TARDÍAS Y UNA O DOS EN PRECOSECHA, REALICE DOS APLICACIONES ANTES DE LA FLORACIÓN.		
MANGO	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	2.0 - 3.0
	APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA SEMANALMENTE.		
VID	PUDRICIÓN DEL RECIMO	<i>Botrytis cinerea</i>	250 g/ 100 L de
	CENICILLA POLVORIENTA	<i>Uncinula necator</i>	agua
	REALICE DOS APLICACIONES ANTES DE LA FLORACIÓN.		
ORNAMENTALES			
ORNAMENTALES	MANCHA NEGRA	<i>Diplocarpon rosae</i>	250 g/ 100 L de
	CENICILLA POLVORIENTA	<i>Oidium spp</i>	agua
	APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA SEMANALMENTE.		

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad, guantes, gorra y botas de hule.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso de agua tibia en la que se haya disuelto una cuchara de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el vómito sea claro. No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR O CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: RODEO 50 PH es un polvo microfino humectable, formulado especialmente para usarse en agua, los volúmenes de agua para la mezcla son de 40 – 90 L, en caso de aplicación aérea sería de 200 – 400 L, con aplicaciones terrestres o manuales ya sea de mochila o de tractor la cantidad se agua dependerá según el tipo de uso. Se sugiere hacer las aplicaciones llenando el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, agregar el producto y completar hasta su capacidad manteniéndolo en constante agitación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea más de 15 km/hr.

INCOMPATIBILIDAD: RODEO 50 PH es compatible con otros productos agroquímicos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares sin alterar sus funciones. No debe mezclarse con productos de reacción fuerte alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS

QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Petroagro, S.A de C.V.

Dirección:

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

Tel:

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

E-mail:

hmreyes@petroagros.com

Página web:

<http://www.petroagros.com/>

PETROAGRO