



FICHA TÉCNICA

SELEXONE 8



DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	SELEXONE 8
Ingrediente activo:	Naled 66.50 %
Ingrediente inerte:	Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados 33.50 %
Presentación:	Concentrado emulsionable
Función:	Insecticida
Registro sanitario:	RSCO-INAC-0150-314-009-067

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

SELEXONE 8 es un insecticida y acaricida **bromo fosforado** de contacto, ingestión y vapor de acción adulticida. La formulación contiene un carrier estabilizador de la formulación que mitiga el riesgo pro fitotoxicidad por efecto de los vapores.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Algodonero (4)	Araña roja (<i>Tetranychus sp.</i>) Chinche lygus (<i>Lygus sp.</i>) Chinche rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Perforador de la hoja (<i>Bucculatrix thurberiella</i>)	1.5-2.0	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 5.272 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (5.492 litros de producto formulado)
Calabaza (4) Melón (1) Pepino (1)	Araña roja (<i>Tetranychus sp.</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5-2.0	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 2.13 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (2.223 litros de producto formulado). No hacer más de 2 aplicaciones por temporada. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2°C
Brócoli Coliflor Col Col de Bruselas (14)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.750 – 1.25	Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras larvas y/o adultos. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C

Chile (1) Jitomate (1)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp</i>) Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Gusano bellotero (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.5-2.0	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (Litros de producto formulado). No hacer más de 5 aplicaciones por temporada. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C
Fresa (1)	Araña roja (<i>Tetranychus sp.</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes sp.</i>) Pulgón (<i>Pentatrichopus spp</i>) Pulgón algodonerero y del melón (<i>Aphis gossypii</i>)	1.5	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 5.272 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (5.492 litros de producto formulado). No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C
Frijol (15)	Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.75-2.0	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 4.711 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (4.90 litros de producto formulado). No hacer más de 5 aplicaciones por temporada.
Pastos (4)	Mosca pinta o salivazo (<i>Aneolamia postica</i>)	1.5-2.0	Hacer las aplicaciones durante el pico de infestación. Aplicar cuando sea necesario con intervalos de 7 días. No permitir el pastoreo por lo menos 24 horas después de la aplicación.
Durazno (7)	Araña roja (<i>Eotetranychus sexmaculatus</i>) Pulgón myzus (<i>Myzus persicae</i>)	500 ml/100 L de agua	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersion para humedecer todo el follaje. No aplicar más de 2.13 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (2.220 litros de producto formulado).
Nogal (7)	Pulgón amarillo del nogal (<i>Monellia costalis</i>) Pulgón negro (<i>Melanocallis caryaefoliae</i>)	500 ml/100 L de agua	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersion para humedecer todo el follaje. No aplicar más de 4.262 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (4.440 litros de producto formulado). No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplicar dentro de los 10 días a cosecha.
Vid (4)	Araña roja (<i>Tetranychus sp.</i>) Pulgón (<i>Aphis illinoisensis</i>)	500 ml/100 L de agua	Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersion para humedecer todo el follaje. No aplicar más de 6.282 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (6.544 litros de producto formulado). No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplicar dentro de los 2 días a cosecha. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2°C.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 72 horas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar los vapores o la aspersion durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que, durante la aplicación, el rocío caiga sobre la piel. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ÉSTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Síntomas de intoxicación: Vómito, náuseas, visión nublada, calambres, sudor, dolores de cabeza, pupilas contraídas y sin reacción, diarrea, temblores de lengua, temblores de párpados, salivación, lagrimeo, pulso lento, contracciones musculares, debilidad, o presión torácica, convulsiones y coma.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir agite perfectamente el envase, a fin de homogenizar el contenido, gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. **SELEXONE 8** es un concentrado emulsionado debe aplicarse con agua, en cantidad suficiente para mojar uniformemente el follaje que se desea proteger, para preparar principalmente la emulsión llene a la mitad el tanque de la aspersora y vaya agregando lentamente el **SELEXONE 8** después agregue el agua faltante manténgase en agitación constante.

CONTRAINDICACIONES: Aplicar a temperaturas alrededor de 22 °C. Corrosivo al hierro, se recomienda lavar perfectamente el equipo inmediatamente después de terminada su aplicación. Evite la aplicación durante los periodos de la actividad de las abejas. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C. Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/ha) No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos.

INCOMPATIBILIDAD: La mezcla se hará con productos registrados, en los cultivos aquí recomendados; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

OTRA INFORMACIÓN: **PETROAGRO, S.A. de C.V.** considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	http://www.petroagros.com/