

**VITIZIM**

FICHA TÉCNICA  
 PETROAGRO, S.A. de C.V.  
**VITIZIM**



PETROAGRO

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

<b>Producto:</b>	<b>VITIZIM</b>
<b>Presentación:</b>	<b>Líquido</b>
<b>Función:</b>	<b>Fertilizante</b>
<b>Registro sanitario:</b>	<b>RSCO-0061/IV/97</b>

**RECOMENDACIONES DE USO**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

<b>Ingrediente activo</b>	<b>% EN PESO</b>
Nitrógeno total (N)	3.67%
Nitrógeno amoniacal (N)	2.10%
Nitrógeno ureico (N)	1.57%
Fosforo asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	10.50%
Potasio (K <sub>2</sub> O)	2.40%
Hierro (Fe)	450 ppm
Zinc (Zn)	560 ppm
Magnesio (Mg)	410 ppm
Manganeso (Mn)	1400 ppm
Cobre (Cu)	864 ppm
Giberelinas	60 ppm

Los extractos de origen orgánico que componen **VITIZIM** contienen un bioestimulante, enzimas y citoquininas que actúan conjunta y sistemáticamente estimulando los procesos vitales de las plantas, germinación de las semilla, brotación de yemas, desarrollo del talluelo, integración del follaje, inducción de floración y fructificación y amarre de flores y frutos. **VITIZIM** al catalizar las reacciones bioquímicas aumenta las reservas de las plantas tratadas al máximo, no es un regulador de crecimiento sino más bien un bioestimulante concentrado del desarrollo vegetal, cuya acción se traduce en una máxima capacidad productiva a través de las facultades de las plantas.

<b>CULTIVO</b>	<b>DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN</b>
HORTALIZAS	Aplicar 400 ml/ha al inicio de la floración y una segunda aplicación de 3 a 4 semanas después.
PAPA	Aplicar 450 ml/ha cuando las plantas tengan 20 a 30 cm de altura y una segunda aplicación de 3 a 4 semanas después.
FRIJOL SOYA	Aplicar 450 ml/ha al inicio de la floración.
MAÍZ SORGO	Aplicar 450 ml/ha al iniciarse el desarrollo del meristemo reproductivo en el primer entre nudo (inicio de formación de panícula en el sorgo o xilote de maíz).
ALFALFA	Aplicar 300 ml/ha cuando las plantas tengan de 10 a 15 cm de altura y repetir después de cada corte. En aplicaciones en agua de riego la dosis es de 600 ml más 2 L de TRAC W50 por hectárea.
ALGODONERO	Aplicar 500 ml al inicio del cuadro y una segunda aplicación de 3 a 4 semanas después.
FRESA	Aplicar 450 ml/ha 4 semanas después del trasplante y repetir cada 3 semanas después.
ORNAMENTALES	Aplicar 1 ml/L de agua cuando las plantas (claveles, crisantemos, gladiolas, pompones) tengan de 10 a 20 ml de altura y una segunda aplicación 3 semanas después.
SEMILLAS EN GENERAL	Humedecerlas con una solución de 100 ml/L de agua.
SEMILLA DE PAPA	Aplicar 500 ml/ha a la semilla depositada en el suelo y cubrirla después.
SEMILLEROS E INVERNADEROS	Aplicar de 40 a 60 ml/ha en suficiente agua para hacer un buen cubrimiento.

**MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO:** Preparación de la mezcla y forma de aplicación: agítese antes de usar al tanque con agua hasta la mitad, agregue la dosis recomendada de **VITZIM**, agite para luego completar el agua faltante, de acuerdo a la siguiente tabla de dosis recomendada.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos, lentes de seguridad, guantes, gorra y botas de hule.

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
- "EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO".

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso de agua tibia en la que se haya disuelto una cucharada de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el vómito sea claro. No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

- "RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".
- "RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS"
- "NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO"

**INCOMPATIBILIDAD:** Este producto es compatible con todos los productos de acción neutra. Recomendamos efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

**GARANTÍA:** **PETROAGRO, S.A. de C.V.** considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	<a href="http://www.petroagros.com/">http://www.petroagros.com/</a>