



FICHA TÉCNICA REPRESOR



PETROAGRO

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	REPRESOR
Ingrediente activo:	Sulfato de cobre pentahidratado 98.23%
Ingrediente inerte:	Impurezas 1.77%
Presentación:	Polvo humectable
Función:	Fungicida
Registro sanitario:	RSCO-FUNG-0357-323-039-098

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

REPRESOR es un fungicida polvo soluble para el control de las enfermedades en los cultivos que a continuación se mencionan, es recomendado para utilizarse en aspersiones terrestres y aéreas. Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha: sin límite. Este producto está exento de tolerancia de residuos.

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (Kg/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
AGUACATERO	SARNA O ROÑA	<i>Sphaceloma perseae</i>	20 - 30
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	
APIO	TIZÓN TARDÍO	<i>Septoria apii</i>	4 - 6
	MANCHA FOLIAR	<i>Phyllosticta apii</i>	
CACAO	PUDRICIÓN NEGRA DE LA MAZORCA	<i>Phytophthora palmivora</i>	4 - 6
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	
CAFETO	MANCHA DEL HIERRO	<i>Cercospora coffeicola</i>	4 - 6
	MOHO DE HILACHAS	<i>Corticium coffeicola</i>	
	MAL ROSADO	<i>Corticium salmonicolor</i>	
	ROYA	<i>Puccinia arachidis</i>	
	OJO DE GALLO	<i>Mycena citricolor</i>	
CÍTRICOS	ROÑA O SARNA	<i>Elsinoe fawcetti</i>	20 - 30
	MELANOSIS	<i>Diaporthe citri</i>	
	MANCHA GRASIENTA	<i>Mycosphaerella citri</i>	
MELÓN, SANDÍA Y CALABAZA	CENICILLA VELLOSA	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	3 - 5
	CENICILLA POLVORIENTA	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	
CHILE	TIZÓN TEMPRANO	<i>Alternaria Solani</i>	1.5 - 2
	MANCHA DEL FRUTO	<i>Xanthomonas versicatoria</i>	
	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum capsici</i>	
	MANCHA DEL TALLO Y LA HOJA	<i>Cercospora capsici</i>	
FRIJOL	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	4.5 - 6
	ROYA	<i>Uromyces phaseoli</i>	
GUAYABO	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum psidii</i>	10 - 20
	FUMAGINA	<i>Capnodium spp</i>	
	PUDRICIÓN DEL FRUTO	<i>Diplodia natalensis</i>	
MANGO	ANTRACNOSIS	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	

	FUMAGINA	<i>Capnodium spp</i>	10 - 20
	PUDRICIÓN DEL FRUTO	<i>Diplodia natalensis</i>	
PAPA	TIZÓN TEMPRANO	<i>Alternaria solani</i>	4 - 6
	TIZÓN TARDÍO	<i>Phytophthora infestans</i>	
	SARNA O ROÑA	<i>Spongospora subterranea</i>	
	MANCHA DE LA HOJA	<i>Stemphylium solani</i>	
PAPAYO	TIZON TEMPRANO	<i>Alternaria solani</i>	10 - 15
PLÁTANO	CHAMUSCO SIGATOKA	<i>Mycosphaerella musicola</i>	10 - 15
TABACO	OJO DE RANA	<i>Cercospora nicotianae</i>	8 - 10
JITOMATE	TIZÓN TEMPRANO	<i>Alternaria solani</i>	4 - 6
	TIZÓN TARDÍO	<i>Phytophthora infestans</i>	
	ANTRACNOSIS	<i>Glomerella cingulata</i>	
	MANCHA DE LA HOJA	<i>Stemphylium solani</i>	
	MARCHITEZ	<i>Pythium spp</i>	
VID	CENICILLA VELLOSA	<i>Plasmopara viticola</i>	8 - 10
	CENICILLA POLVORIENTA	<i>Uncinula necator</i>	
DOSIS POR 100 LITROS DE AGUA PARA TODOS LOS CULTIVOS ES DE 1 Kg POR CADA UNO DE ESTOS			

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos, lentes de seguridad, guantes, gorra y botas de hule.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso de agua tibia en la que se haya disuelto una cuchara de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el vómito sea claro. No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para preparar un tambor de 200 litros del caldo fungicida, disolver 2.0 kg de REPRESOR en aproximadamente 180 litros de agua; diluir 2.0 kg de cal en aproximadamente 20 litros de agua y agregarlo lentamente agitando en forma constante, hasta que se termine de formar un precipitado azul claro. Úselo el mismo día, no se deje almacenado.

INCOMPATIBILIDAD: REPRESOR es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes formulados comercialmente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos, bajo dosis recomendadas.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS

QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	http://www.petroagros.com/

PETROAGRO