

FICHA TÉCNICA RODEO 50 PH



DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto: RODEO 50 PH Ingrediente activo: Captan 50%

Ingrediente inerte: Diluyente, humectante, dispersante y compuestos

relacionados 50%

Presentación: Polvo humectable

Función: Fungicida

Registro sanitario: RSCO-FUNG-0306-332-002-050

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RODEO 50 PH es un fungicida agrícola micronizado (polvo humectable) que pertenece al grupo de los carboximidas formulados a base de captan en presentación de polvo humectable, utilizado para la prevención y control de enfermedades en los cultivos señalados en el cuadro de recomendaciones.

CULTIVO	ENFERMEDADES Y RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN		DOSIS		
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/ha)		
HORTALIZAS					
AJO, CEBOLLA Y	MANCHA PURPURA	Alternaria porri	1.5 - 2.0		
BERENJENA	ANTRACNOSIS	Colletotrichum spp	2.0 - 3.0		
APLÍQUESE AL PRIMER SÍNTOMA, REPITA CON INTERVALOS DE 5 – 7 DÍAS.					

	CUCURBITÁCEAS			
CALABACITA Y MELÓN	ANTRACNOSIS	Colletotrichum spp	3.0	
	APLÍQUESE CON SUFICIENTE AGUA PARA HACER UN BUEN CUBRIMIENTO Y			
	REPITE CADA 5 – 7 DÍAS SEGÚN SE NECESITE, SE PUEDE APLICAR HASTA LA			
	COSECHA.			
PEPINO Y SANDIA	MANCHA DE LA HOJA	Alternaria cucumerina	1.5 - 2.5	
CHILE	CERCOSPORA	Cercospora capsici	2.0 - 3.0	
	TIZÓN TEMPRANO	Alternaria solani		
	APLIQUE CON INTERVALOS DE 3 – 7 DÍAS.			
FRESA	MANCHA O PECA DE LA HOJA	Mycosphaerella fragariae	1.0-1.5	
	APLIQUE CUANDO SE INICIEN LOS BROTES Y ANTES DE LA FORMACIÓN DE			
	FRUTOS, REPITA SEMANALMENTE.			
JITOMATE	TIZÓN TEMPRANO	Alternaria solani	1.5 - 2.5	
	TIZÓN TARDÍO	Phytophthora infestans	2.0 - 3.0	
	MANCHA DE LA HOJA	Stemphylium solani	2.0 - 3.0	
	PUDRICIÓN DE LA SEMILLA	Fusarium sp	2.0 - 3.0	
	PUDRICIÓN DE LA RAÍZ	Rhizoctonia sp	2.0 - 3.0	
	APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA DE 5 – 7 DÍAS.			
	FRUTALES			
AGUACATERO	ROÑA O SARNA DEL FRUTO	Sphaceloma perseae	3.0	
	ANTRACNOSIS	Colletotrichum	1.5 - 2.0	
		gloeosporioides		
	MANCHA DE LA HOJA	Cercospora purpurea	1.0 - 1.5	

MANZANO Y PERAL	CENICILLA POLVORIENTA	Podosphaera leucotricha	2.0		
	TIRO DE MUNICIÓN	Clasterosporium	2.0 - 3.0		
		carpophilum			
	ROÑA O SARNA	Venturia inaequalis	3.0		
	HAGA UNA O DOS APLICACIONES CON FUMIGACIONES TARDÍAS Y UNA O DOS EN				
	PRECOSECHA, REALICE DOS APLICACIONES ANTES DE LA FLORACIÓN.				
MANGO	ANTRACNOSIS	Colletotrichum	2.0 - 3.0		
		gloeosporioides			
	APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA SEMANALMENTE.				
VID	PUDRICIÓN DEL RECIMO	Botrytis cinerea	250 g/ 100 L de		
	CENICILLA POLVORIENTA	Uncinula necator	agua		
	REALICE DOS APLICACIONES ANTES DE LA FLORACIÓN.				
ORNAMENTALES					
ORNAMENTALES	MANCHA NEGRA	Diplocarpon rosae	250 g/ 100 L de		
	CENICILLA POLVORIENTA	Odium spp	agua		
	APLIQUE AL PRIMER SÍNTOMA Y REPITA SEMANALMENTE.				

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad, guantes, gorra y botas de hule.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso de agua tibia en la que se haya disuelto una cuchara de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el vómito sea claro. No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL
 PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE
 ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO
 CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO
 PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O
 CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR O CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: RODEO 50 PH es un polvo microfino humectable, formulado especialmente para usarse en agua, los volúmenes de agua para la mezcla son de 40 – 90 L, en caso de aplicación aérea seria de 200 – 400 L, con aplicaciones terrestres o manuales ya sea de mochila o de tractor la cantidad se agua dependerá según el tipo de uso. Se sugiere hacer las aplicaciones llenando el tanque hasta ¾ de su capacidad, agregar el producto y completar hasta su capacidad manteniéndolo en constante agitación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea más de 15 km/hr.

INCOMPATIBILIDAD: RODEO 50 PH es compatible con otros productos agroquímicos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares sin alterar sus funciones. No debe mezclarse con productos de reacción fuerte alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS

QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Tel:

E-mail:

Nombre de la compañía: Petroagro, S.A de C.V.

Dirección: km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

hmreyes@petroagros.com

Página web: http://www.petroagros.com/