



# FICHA TÉCNICA SELEXONE 8



## DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Producto:           | SELEXONE 8                                                    |
| Ingrediente activo: | Naled 66.50 %                                                 |
| Ingrediente inerte: | Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados 33.50 % |
| Presentación:       | Concentrado emulsionable                                      |
| Función:            | Insecticida                                                   |
| Registro sanitario: | RSCO-INAC-0150-314-009-067                                    |

## RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS  
INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**SELEXONE 8** es un insecticida y acaricida **bromo fosforado** de contacto, ingestión y vapor de acción adulticida. La formulación contiene un carrier estabilizador de la formulación que mitiga el riesgo pro fitotoxicidad por efecto de los vapores.

| CULTIVOS                                              | PLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOSIS<br>L/ha | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algodonero<br>(4)                                     | Araña roja<br>( <i>Tetranychus sp.</i> )<br>Chinche lygus<br>( <i>Lygus sp.</i> )<br>Chinche rápida<br>( <i>Creontiades rubrinervis</i> )<br>Mosquita blanca<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )<br>Mosquita blanca de los invernaderos<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )<br>Perforador de la hoja<br>( <i>Bucculatrix thurberiella</i> ) | 1.5-2.0       | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 5.272 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (5.492 litros de producto formulado)                                                                                            |
| Calabaza<br>(4)<br>Melón<br>(1)<br>Pepino<br>(1)      | Araña roja<br>( <i>Tetranychus sp.</i> )<br>Gusano falso medidor de la col<br>( <i>Trichoplusia ni</i> )<br>Mosquita blanca<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )                                                                                                                                                                                 | 1.5-2.0       | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 2.13 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (2.223 litros de producto formulado). No hacer más de 2 aplicaciones por temporada. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2°C |
| Brócoli<br>Coliflor<br>Col<br>Col de Bruselas<br>(14) | Palomilla dorso de diamante<br>( <i>Plutella xylostella</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.750 – 1.25  | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras larvas y/o adultos. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chile (1)<br>Jitomate (1) | Minador de la hoja<br>( <i>Liriomyza sp</i> )<br>Mosquita blanca de los invernaderos<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )<br>Gusano bellotero<br>( <i>Heliothis virescens</i> )<br>Gusano soldado<br>( <i>Spodoptera exigua</i> ) | 1.5-2.0              | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (Litros de producto formulado). No hacer más de 5 aplicaciones por temporada. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C |
| Fresa (1)                 | Araña roja<br>( <i>Tetranychus sp.</i> )<br>Mosquita blanca<br>( <i>Trialeurodes sp.</i> )<br>Pulgón<br>( <i>Pentatrichopus spp</i> )<br>Pulgón algodonero y del melón<br>( <i>Aphis gossypii</i> )                                  | 1.5                  | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 5.272 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada (5.492 litros de producto formulado). No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C                                    |
| Frijol<br>(15)            | Conchuela del frijol<br>( <i>Epilachna varivestis</i> )<br>Gusano falso medidor de la col<br>( <i>Trichoplusia ni</i> )<br>Gusano soldado<br>( <i>Spodoptera exigua</i> )                                                            | 0.75-2.0             | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Use suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Aplique a intervalos de 5-7 días mientras persistan las plagas. No aplicar más de 4.711 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada. (4.90 litros de producto formulado). No hacer más de 5 aplicaciones por temporada.                                   |
| Pastos (4)                | Mosca pinta o salivazo<br>( <i>Aneolamia postica</i> )                                                                                                                                                                               | 1.5-2.0              | Hacer las aplicaciones durante el pico de infestación. Aplicar cuando sea necesario con intervalos de 7 días. No permitir el pastoreo por lo menos 24 horas después de la aplicación.                                                                                                                                                                                                                 |
| Durazno (7)               | Araña roja<br>( <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> )<br>Pulgón myzus<br>( <i>Myzus persicae</i> )                                                                                                                                     | 500 ml/100 L de agua | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersión para humedecer todo el follaje. <b>No aplicar más de 2.13 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada</b> (2.220 litros de producto formulado).                                                                                                                                                   |
| Nogal (7)                 | Pulgon amarillo del nogal<br>( <i>Monellia costalis</i> )<br>Pulgón negro<br>( <i>Melanocallis caryaefoliae</i> )                                                                                                                    | 500 ml/100 L de agua | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersión para humedecer todo el follaje. <b>No aplicar más de 4.262 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada</b> (4.440 litros de producto formulado). No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplicar dentro de los 10 días a cosecha.                                                        |
| Vid (4)                   | Araña roja<br>( <i>Tetranychus sp.</i> )<br>Pulgón<br>( <i>Aphis illinoisensis</i> )                                                                                                                                                 | 500 ml/100 L de agua | Aplicar al follaje, cuando se observen los primeros indicios de la plaga. Haga la aspersión para humedecer todo el follaje. <b>No aplicar más de 6.282 kg de ingrediente activo por hectárea por temporada</b> (6.544 litros de producto formulado). No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplicar dentro de los 2 días a cosecha. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2°C.            |

(I) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 72 horas

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que, durante la aplicación, el rocío caiga sobre la piel. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ÉSTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Síntomas de intoxicación: Vómito, náuseas, visión nublada, calambres, sudor, dolores de cabeza, pupilas contraídas y sin reacción, diarrea, temblores de lengua, temblores de párpados, salivación, lagrimeo, pulso lento, contracciones musculares, debilidad, o presión torácica, convulsiones y coma.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Antes de abrir agite perfectamente el envase, a fin de homogenizar el contenido, gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. **SELEXONE 8** es un concentrado emulsionado debe aplicarse con agua, en cantidad suficiente para mojar uniformemente el follaje que se desea proteger, para preparar principalmente la emulsión llene a la mitad el tanque de la aspersora y vaya agregando lentamente el **SELEXONE 8** después agregue el agua faltante manténgase en agitación constante.

**CONTRAINDICACIONES:** Aplicar a temperaturas alrededor de 22 °C. Corrosivo al hierro, se recomienda lavar perfectamente el equipo inmediatamente después de terminada su aplicación. Evite la aplicación durante los periodos de la actividad de las abejas. No aplicar a temperaturas mayores de 32.2 °C. Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/ha) No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos.

**INCOMPATIBILIDAD:** La mezcla se hará con productos registrados, en los cultivos aquí recomendados; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**OTRA INFORMACIÓN:** PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre de la compañía:

Dirección:

Tel:

E-mail:

Página web:

Petroagro, S.A de C.V.

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

hmreyes@petroagros.com

<http://www.petroagros.com/>