

“USO AGRÍCOLA”

LUCAFLOW

azufre elemental

Suspensión Acuosa
Fungicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Azufre elemental: Azufre (Equivalente a 725 g de i.a./L a 20°C)	52.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyentes, dispersantes y acondicionadores	48.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-049-008-052

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCAFLOW es un fungicida formulado a base de azufre elemental, preventivo y de contacto en presentación de suspensión acuosa; eficaz en el control de enfermedades que atacan los cultivos y plagas que se enlistan a continuación:

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha
	Nombre común	Nombre científico	
Chile	Cenicilla	<i>Oidiopsis taurica</i>	2.5-3.0
	Cenicilla	<i>Erysiphe sp</i>	2.5-3.0



Cacahuete	Chahuixtle o roya Araña roja	<i>Puccinia arachidis</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.0-3.0 2.5-3.0
Chícharo Garbanzo Frijol	Roya Cenicilla Araña roja	<i>Uromyces appendiculatus</i> <i>Uromyces ciceris-arietis</i> <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.0-3.0 2.0-3.0 2.5-3.0
Soya	Roya Cenicilla	<i>Uromyces appendiculatus</i> <i>Uromyces ciceris-arietis</i> <i>Erysiphe polygoni</i>	2.0-3.0 2.0-3.0
Berenjena Jitomate	Cenicilla Araña roja	<i>Leveillula taurica</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.5-3.0 2.5-3.0
Papa	Cenicilla Tizón temprano	<i>Leveillula taurica</i> <i>Alternaria solani</i>	2.5-3.0 2.5-3.0
Calabaza Pepino Melón Sandía	Cenicilla Mildiu Araña roja	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.0-3.0 2.0-3.0 2.5-3.0
Alfalfa	Viruela Cenicilla Cenicilla Araña roja	<i>Puccinia cacabata</i> <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.5-3.0 2.5 2.5-3.0 2.5
Algodonero	Viruela Cenicilla Cenicilla	<i>Puccinia cacabata</i> <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i>	2.5-3.0 2.5 2.5-3.0
Cempasúchil	Viruela Cenicilla Cenicilla Araña roja	<i>Puccinia cacabata</i> <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2.5-3.0 2.5 2.5-3.0 2.5-3.0
Aguacatero	Fumagina Araña roja del aguacatero	<i>Capnodium sp</i> <i>Oligonychus punicae</i>	250-300 ml/100 L de agua 250-300 ml/100 L de agua
Durazno Ciruelo	Cenicilla Verrucosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Taphrina deformans</i>	100-250 ml/100 L de agua
Chabacano	Cenicilla Cenicilla	<i>Podosphaera oxycanthae</i> <i>Sphaerotheca pannosa</i>	100-200 ml/100 L de agua 100-200 ml/100 L de agua
Fresa	Cenicilla Araña ciclamina	<i>Sphaerotheca humuli</i> <i>Steneotarsonemus pallidus</i>	200-300 ml/100 L de agua 2.5-3.0
Mango	Cenicilla	<i>Oidium mangiferae</i>	200-300 ml/100 L de agua
Manzano Peral	Cenicilla Antracnosis	<i>Podosphaera leucotricha</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	200-300 ml/100 L de agua
Vid	Cenicilla	<i>Uncinula necator</i>	200-300 ml/100 L de agua
Limonero Naranja Tangerino Toronjo	Fumagina Antracnosis	<i>Capnodium citri</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	250-300 ml/100 L de agua
Ornamentales	Cenicilla Cenicilla	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	1.5-3.0
Intervalo de Seguridad (IS): Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. IS: Cero días para todos los cultivos. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha integrada, mascarilla equipada con cartuchos para vapores, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Abra el envase realizando esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **LUCAFLOW** medida con ayuda de una probeta, y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

En aplicaciones terrestres: La proporción será de 200 a 400 L/ha.

En aplicaciones aéreas: Los volúmenes de agua para la mezcla son de 50-80 L/ha, para árboles frutales diluir las dosis recomendadas en 100 L de agua procurando cubrir todo el follaje.

CONTRAINDICACIONES

No aplique **LUCAFLOW** en cucurbitáceas susceptibles, sin antes haber hecho una pequeña prueba.

No aplicar **LUCAFLOW** a temperaturas mayores a 35°C.

FITOTOXICIDAD

LUCAFLOW no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD

NO mezclar este producto con otros productos agroquímicos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

